

大切な農作物を霜から守る

フロストバスター

低温予報の前日に散布する凍霜害防止剤

コーヒー由来の天然成分エキス

新発売

【対象作物】

りんご・日本なし・もも、
その他果樹(花芽が霜害対象のもの)



1kg

(税別)

円

《数量限定発売》

06-6318-7567

使用方法

1

低温予報の前日に
本エキスを500倍に
希釈して散布してください



2

本エキスが花芽を覆い、
低温時に
凍結しにくくなります



3

一製品あたり
20aを目安に
散布してください



使用上の注意

- ・使用時期や気象条件等により、100%の効果が期待できない場合があります。
- ・開封後は、速やかに使用ください。※開封後、長時間経過すると浮遊物が発生する可能性があります。
- ・推奨希釈倍率以外で散布すると効果が低下する可能性があります。
- ・散布後24時間以上経過すると効果が低下する可能性があります。

フロストバスター専用お問合せ先

06-6318-7567

※9時～17時
土・日・祝を除く

製造者:株式会社 KUREi -カレイ- 大阪府吹田市山手町3-3-35 関西大学イノベーション創生センター212
販売者:アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社 茨城県守谷市緑1-1-21

2019年 試験「りんごの霜害防除」

【調査概要】りんご「ふじ」生産者の畑において、低温予報前日に本エキスの凍霜害防止効果を評価した

【調査協力先】長野県小諸市 生産者A

《処理方法》りんご「ふじ」の畑において、試験区、対照区各5本ずつ設定し、低温予報前日、試験区の5本に本エキスを散布

※散布日:①2019/4/27(翌日4/28に低温遭遇) ②2019/5/7(翌日5/8に低温遭遇) ※展着剤:木酢液500倍


《調査方法・調査項目》低温後、障害花発生程度(障害発生率=障害花数/調査花数)について、試験区・対照区を比較調査



【対照区】
霜害直後
多くの花が
褐変し落花
(5/9撮影)



【対照区】
収穫直前
果実の結実量が
少ない
(11/22撮影)



【試験区】
霜害直後多少
褐変している
ものの着花
(5/9撮影)



【試験区】
収穫直前
果実が多く結実
している
(11/22撮影)



2019年 試験「日本なしの霜害防除」

【調査概要】

日本なし「豊水」、「幸水」生産者の畑において、低温予報前日に本エキスの凍霜害防止効果を評価した

【調査協力先】

長野県下伊那郡下條村 生産者B

《処理方法》

日本なし「豊水」「幸水」の畑において、試験区、対照区各5本ずつ設定し、低温予報前日、試験区の5本に本エキスを(500倍希釈)を散布

※散布日:生産者判断で低温予報前日に散布

《調査方法・調査項目》

低温後、障害花発生程度(障害発生率=障害花数/調査花数)について、試験区・対照区を比較調査

